

NOMBRE DEL PRODUCTO

TEMPIO® F

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

TEMPIO® F es un fungicida, especialmente diseñado para el control de mildiu (Plasmopara vitícola) en Vid de vinificación. Se caracteriza por su actividad sistémica y de contacto y su efecto preventivo.

COMPOSICIÓN

BENALAXIL-M 3,75% + FOLPET 48% [WG] P/P

FORMULACIÓN

GRANULADO DISPERSABLE EN AGUA

Nº DE REGISTRO

Inscrito en el R.O.P y M.F. con el Nº 24.568

PRESENTACIÓN

Bolsas en complejo polietileno/aluminio/poliéster de 1 kg y 5 kg.

MODO DE ACCIÓN

TEMPIO® F es el producto resultante de la asociación del Benalaxil-M y el Folpet.

Benalaxil-M es el isómero activo del Benalaxil, una fenilamida sistémica con acción fungicida preventiva y curativa que impide el desarrollo, la liberación de zoosporas y/o su germinación. Folpet es un fungicida perteneciente al grupo de las ftalimidas con acción multisitio y actividad sobre mildius y escoriosis.

Las principales características del Tempio® F:

- Gran capacidad de penetración y sistemía en los tejidos vegetales
- Buena acción de choque, prevención y curación
- Tiene un efecto de control secundario sobre la Botritis
- Buen perfil toxicológico y respetuoso con la mayoría de los beneficiosos
- Para el manejo de resistencias, Benalaxil-M está clasificado dentro del grupo A y el Folpet dentro del grupo M04 – fungicidas multisitio (FRAC).

USOS Y DOSIS AUTORIZADAS

USO	AGENTE	Dosis	Nº Apli	Interv.	Vol. Caldo	P.S(días)
Vid de Vinificación	Mildiu de la vid, Plasmopara viticola	0,2 %	3	10-14 d	200 - 1000/ha	28

CONDICIONES GENERALES DE USO

Aplicar en pulverización con tractor sin superar la dosis máxima de 2 kg/ha. Realizar los tratamientos a partir del momento en que el cultivo se encuentre en estado sensible a los ataques. El inicio de la aplicación deberá marcarlo las condiciones de humedad, temperatura y estado vegetativo. En caso de que no se produzcan lluvias realizar el primer tratamiento antes de la formación de las yemas (5-8 hojas).

El intervalo entre tratamientos coincidirá en general, con los estados fenológicos de: inicio de floración, final de la floración y racimos con granos tamaño guisante. No utilizar en vides que vayan a ser utilizadas con fines de multiplicación.

A efectos de prevenir la aparición de resistencias, no efectuar con este producto ni con ningún otro que contenga benalaxil-m más de 3 aplicaciones por ciclo de cultivo.

Uso reservado agricultores y aplicadores profesionales (cultivos agrícolas, plantaciones agrícolas). Producto no autorizado en ámbitos distintos de la producción primaria agraria definidos en el artículo 46 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre



Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado en el depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida del sistema integrado de gestión SIGFITO.

Advertencia: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

**Producto distribuido por GOWAN ESPAÑOLA
FITOSANITARIOS, S.L. Ronda General Mitre, 28-
30, 08017 Barcelona**